



Bollettino del 19/05/2017

METEO

ARPAV-SERVIZIO METEOROLOGICO REGIONALE: nel periodo a cavallo tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di quella in corso si sono verificati temporali con precipitazioni variabili da zona a zona, ma che in alcuni casi hanno superato i 40 mm. Tra venerdì e sabato una perturbazione attualmente con nucleo tra l'Europa Nord-occidentale e l'Islanda si avvicinerà portando piovvaschi, rovesci, temporali ed un calo delle temperature. Da domenica in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il ritorno di condizioni anticicloniche.

FENOLOGIA

Le osservazioni in campo sottolineano un progresso fenologico della vegetazione, che in alcuni casi è stato di 3 foglie nell'ultima settimana; circa i grappoli nelle zone più precoci si trovano i primissimi segni di inizio fioritura.

VARIETÀ	LOCALITÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio)	NUOVE FOGLIE IN 7 GG	FENOLOGIA GRAPPOLO
Glera	Colfosco	11	3	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Glera	Crevada	10	3	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Glera	Formeniga	12	2	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Glera	Ogliano	11	2	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Glera	Villa di Villa	11	3	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Pinot grigio	Cordignano	10	3	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Pinot grigio	San Fior	9	1	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Pinot grigio	San Giacomo di Veglia	10	1	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Pinot grigio	San Vendemiano	10	2	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Chardonnay	Colle Umberto	10	2	Rigonfiamento dell'infiorescenza
Chardonnay	Conegliano	9	1	Rigonfiamento dell'infiorescenza

DIFESA INTEGRATA

Peronospora

L'intervento consigliato nell'ultimo bollettino garantirà una buona protezione anche per l'inizio della prossima settimana. Considerando l'approssimarsi della fioritura, il possibile peggioramento meteo previsto nella seconda parte della prossima settimana e il sensibile accrescimento vegetativo favorito dall'innalzamento termico, si consiglia di intervenire nell'arco della prossima settimana cercando di anticipare le future precipitazioni, secondo quanto di seguito indicato:

Metalaxil o Metalaxil-M o Fluopicolide

+

Partner di copertura (attenzione ai limiti nel numero di ditiocarbammati eseguiti)



Il tutto alle dosi per ha indicate in etichetta.

Oidio

Considerando la fase particolarmente delicata per lo sviluppo del patogeno a causa delle temperature favorevoli e delle ripetute precipitazioni, si consiglia di ripristinare la protezione negli stessi tempi indicati per la peronospora con:

Zolfo bagnabile alla dose di 4 kg/ha

+

Strobilurine o IBS (attenzione ai limiti Import Tolerance per USA), alla dose per ha indicata in etichetta.

Biologici:

Si consiglia di ripristinare la copertura nei tempi sopra indicati attraverso l'utilizzo di:

Poltiglia bordolese a dose minima di etichetta

e

Zolfo bagnabile alla dose di 4 kg/ha.

Visto che la parte ha raggiunto uno spessore consistente si consiglia di non scendere al disotto dei 300 l/ha di volume di bagnatura.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI