



Bollettino del 23.06.17

METEO

ARPAV-SERVIZIO METEOROLOGICO REGIONALE: Una vasta area di alta pressione, presente da giorni sul Mediterraneo centro-occidentale, si attenuerà nel corso della giornata di sabato permettendo l'ingresso di correnti più fresche da nord-ovest, le quali domenica porteranno una fase di tempo instabile con rovesci, temporali e moderato calo termico. In seguito correnti occidentali determineranno lunedì tempo più stabile con ampi tratti soleggiati e martedì condizioni di variabilità con possibili nuove precipitazioni.

DIFESA INTEGRATA

Peronospora

L'intervento consigliato nell'ultimo bollettino garantirà sufficiente protezione fino al termine di questa settimana, anche a fronte delle piogge previste per domenica 25. In virtù della fase a meteo variabile che si verificherà a partire da metà settimana si consiglia di intervenire tra lunedì 26 e mercoledì 28 e comunque prima delle eventuali piogge, con le seguenti molecole:

Ametoctradin + dimetomorph

o

Mandipropamide + Zoxamide

o

Zoxamide + rame

(attenzione al numero di CAA, come dimetomorph, mandipropamide, già impiegati)

il tutto alle dosi per ha indicate in etichetta.

NB: porre attenzione all'intervallo tra i trattamenti riportato in etichetta in caso di utilizzo del medesimo prodotto fitosanitario, e se non rispettato, alternarlo con un altro principio attivo.

Oidio

I modelli previsionali segnalano un elevato rischio di infezione del fungo, favorito dalle condizioni meteorologiche particolarmente soleggiate e alta umidità relativa; si consiglia di ripristinare la protezione negli stessi tempi indicati per la peronospora con:

Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha

+

Quinoxifen o Cyflufenamid (in alternanza al precedente trattamento), alla dose per ha indicata in etichetta.

NB: porre attenzione al numero massimo di interventi con la medesima molecola e all'intervallo tra i trattamenti riportato in etichetta in caso di utilizzo del medesimo prodotto fitosanitario; se non rispettato, alternarlo con l'altro principio attivo.

Biologici:

Si consiglia di ripristinare la copertura nei tempi sopra indicati attraverso l'utilizzo di:

Poltiglia bordolese a metà della dose minima di etichetta

+

idrossido di rame a metà della dose minima di etichetta

+

Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha.



Visto che la parete ha raggiunto uno spessore consistente si consiglia di non scendere al disotto dei 400 l/ha di volume di bagnatura.

GESTIONE DELLA CHIOMA

In luogo allo sviluppo vegetativo e alla fase di allegagione abbondantemente avanzata è opportuno iniziare le operazioni di sfemminellatura della fascia grappoli al fine di favorire l'areazione e di conseguenza una bagnatura omogenea.

INSETTI

Per coloro i quali non avessero ancora effettuato il trattamento insetticida si consiglia di intervenire con i principi attivi e nei tempi suggeriti dai precedenti bollettini.

Inoltre, qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto sfalcio totale dell'erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l'entomofauna utile.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI