



Bollettino del 29.06.17

METEO

ARPAV-SERVIZIO METEOROLOGICO REGIONALE: La fase perturbata di mercoledì 28 e giovedì 29 saranno seguiti da tempo variabile, a tratti instabile, specie sulle zone montane e pedemontane, domenica pressione in moderato aumento e condizioni di tempo più stabile.

DIFESA INTEGRATA

Peronospora

Le piogge consistenti verificatesi nelle giornate di mercoledì e giovedì hanno determinato un celere dilavamento dei prodotti fitosanitari impiegati nell'ultimo intervento consigliato. Pertanto, è consigliabile ripristinare la copertura della vegetazione tra venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio cercando di anticipare eventuali possibili ulteriori precipitazioni, secondo la seguente strategia:

poltiglia bordolese alla dose di 2 kg/ha

+

idrossido di rame alla dose di:

- **2 kg/ha** (nel caso il prodotto impiegato contenga il 20% di rame metallo)
- **1 kg/ha** (nel caso il prodotto impiegato contenga il 35% di rame metallo)

Oidio

In seguito al dilavamento della copertura si consiglia di ripristinare la protezione negli stessi tempi indicati per la peronospora con:

Zolfo bagnabile alla dose di 5 kg/ha

Visto che la parete ha raggiunto uno spessore consistente si consiglia di non scendere al disotto dei 400 l/ha di volume di bagnatura.

DIFESA BIOLOGICA

Peronospora

Ripristinare la copertura con:

poltiglia bordolese alla dose di 1 kg/ha

+

idrossido di rame alla dose di 1 kg/ha.

Oidio

Ripristinare la copertura con zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 5 kg/ha.

GESTIONE DELLA CHIOMA

In luogo allo sviluppo vegetativo e alla fase di allegagione abbondantemente avanzata è opportuno continuare le operazioni di sfemminellatura in fascia grappoli e di cimatura al fine di favorire l'areazione e di conseguenza una bagnatura omogenea.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI

