

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO



Bollettino Concimazione del 20 Marzo 2018

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto - Bollettino concimazione primaverile 2018

L'avvicinarsi della ripresa vegetativa ripropone il tema della concimazione della vite. Nella tabella sottostante sono riportati gli apporti massimi consigliabili in kg/ha per ogni singolo elemento, suddivisi tra Zona DOC e DOCG, sulla base delle produzioni massime previste nei rispettivi disciplinari. I valori riportati in tabella sono da considerarsi totali annui e si riferiscono quindi alla somma delle concimazioni di autunno 2017 e primavera/estate 2018; essi inoltre potranno essere ridotti dal viticoltore in riferimento alla situazione specifica del singolo vigneto.

| | DOC | | | DOCG | | |
|------------------|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| | Azoto | Fosforo | Potassio | Azoto | Fosforo | Potassio |
| vigneto inerbito | 80 | 80 | 120 | 50 | 40 | 80 |

Si consiglia di considerare le letamazioni eseguite successivamente all'ultima vendemmia nel conteggio delle concimazioni per l'annata 2017/18; nella tabella sottostante i valori di riferimento per apporti di 100 q.li/ha di prodotto tal quale:

| | AZOTO | FOSFORO | POTASSIO |
|----------------|-------|---------|----------|
| letame bovino | 50 | 10 | 60 |
| liquame bovino | 40 | 13 | 35 |

Ai i soci che successivamente alla vendemmia avessero correttamente già effettuato la concimazione autunnale, distribuendo anche una quota parte di Azoto, si consiglia di completare l'apporto nutritivo nel periodo immediatamente successivo alla fioritura della vite. A coloro i quali in autunno avessero apportato principalmente Fosforo e Potassio, si consiglia di intervenire con la concimazione azotata frazionando l'apporto in due momenti: quando i germogli raggiungono lo sviluppo di 10 cm circa e nel post fioritura. A chi non fosse intervenuto in autunno 2017, si consiglia di effettuare la concimazione sempre frazionando l'apporto in almeno due momenti, dopo il germogliamento e dopo la fioritura.

Per quanto riguarda i vigneti giovani (1° e 2° anno) gli apporti di elementi nutritivi consigliati sono indicati nella tabella sottostante, sempre come quantità annue ad ettaro, e che la concimazione deve essere effettuata al piede della vite.

| | Azoto | Fosforo | Potassio |
|-----------------|-------|---------|----------|
| vigneto 1° anno | 40 | 15 | 20 |
| vigneto 2° anno | 60 | 25 | 40 |

Si ricorda ai viticoltori come la liberazione e la conseguente disponibilità degli elementi nutritivi nel terreno apportati tramite i concimi organici è tendenzialmente lenta, pertanto il loro impiego è consigliabile in autunno.

Per massimizzare gli effetti della concimazione, per qualsiasi forma di fertilizzante, sia esso organico, minerale o misto, è buona norma procedere all'interramento degli stessi mediante una lavorazione superficiale.