



Bollettino n° 4 del 16 aprile 2018

METEO

Nell'annata in corso la ripresa vegetativa della vite è accompagnata da una lunga fase di instabilità meteorologica con numerose piogge diffuse ad intensità variabile e una flessione delle temperature negli ultimi giorni. Nelle prossime ore assisteremo ad un graduale aumento della "pressione fino a sabato; da domenica avvicinamento di un nuovo impulso perturbato con aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni specie lunedì." (Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

Dai rilievi fenologici effettuati giovedì 12 aprile appare chiaro come la varietà Glera sia in fase fenologica BBCH 09 ovvero appena precedente all'apertura dei germogli in tutto il territorio di competenza della cantina. Il Pinot grigio si trova tra la fase BBCH 06 e 07 ovvero a gemma cotonosa con i primi germogli a punte verdi. In tabella il dettaglio dei rilievi fenologici:

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO
Colfosco	Glera	Il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Crevada	Glera	Punte dei germogli verdi appena visibili
Formeniga	Glera	Il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Ogliano	Glera	Il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Villa di Villa	Glera	Il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Cordignano	Pinot grigio	Stadio cotonoso: il cotone è chiaramente visibile
San Flor	Pinot grigio	Punte dei germogli verdi appena visibili
San Giacomo di Veglia	Pinot grigio	Stadio cotonoso: il cotone è chiaramente visibile
San Vendemiano	Pinot grigio	Punte dei germogli verdi appena visibili
Colle Umberto	Chardonnay	Il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Conegliano	Chardonnay	Punte dei germogli verdi appena visibili

STRATEGIA DI DIFESA

Escoriosi

L'inoculo della malattia nei vigneti testimone appare molto bassa sia per la varietà Glera che per il Pinot grigio. La prolungata fase umida che stiamo vivendo in questa fase a cavallo del germogliamento rappresenta la condizione perfetta per il verificarsi delle infezioni da parte del patogeno in questione.

Pertanto, nei vigneti che l'anno scorso o negli anni precedenti hanno avuto attacchi di escoriosi si consiglia di effettuare un trattamento, approfittando della finestra di bel tempo prevista nel fine settimana, a base di **metiram** o **propineb** o **zolfo bagnabile**, prendendo in considerazione la dose di etichetta a concentrazione (kg/ettolitro).

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC
Sede legale: Via del Campardo, 3 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
info@cantinavittorio.it - pec: infocantinavittorio@pec.confcooperative.it
C.F. e P. IVA e Reg. Impr. TV 00190690263 - N. Iscr. Albo Coop. TV A142425
Sedi operative:
Via del Campardo, 3 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 500209 - Fax 0438 501779
Via Maggiore Piovesana, 15 - 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 22268 - Fax 0438 22186
Via San Giuseppe, 54 - 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 410474 - Fax 0438 370700
Via Brigata Osoppo, 174 - 30074 Fontanafredda (PN) - Tel. 0434 99101 - Fax 0434 999827





Nel caso del metiram si ricorda che il numero massimo di trattamenti previsti è pari a 3, e quindi nel caso di interventi esclusivamente cautelativi si consiglia di impiegare un altro prodotto tra quelli indicati.

Il volume di bagnatura deve essere sufficiente a distribuire la miscela preparata su tutti i giovani germogli e quindi si dovranno impiegare circa 200 L/ettaro.

STRATEGIA DI DIFESA BIOLOGICA

Escoriosi

Nel caso di vigneti condotti con metodo biologico si consiglia di intervenire con **zolfo bagnabile** alla dose massima di etichetta a concentrazione (kg/ettolitro) cercando di impiegare zolfo di buona qualità.

Il volume di bagnatura deve essere sufficiente a distribuire la miscela preparata su tutti i giovani germogli e quindi si dovranno impiegare circa 200 L/ettaro.

Il secondo trattamento preventivo contro questa malattia coinciderà probabilmente con il primo intervento antiperonosporico.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI