



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

11° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 11 del 11 Maggio 2018

METEO

Fino a sabato 12/5 una situazione di tempo in prevalenza variabile, a tratti instabile sui rilievi. In seguito il passaggio di una saccatura di origine atlantica porterà condizioni di maggiore instabilità.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.apa.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi fenologici effettuati venerdì 11 Maggio evidenziano un notevole progresso della crescita dei germogli. In tabella sono riportati i dati relativi al rilievo dell'11 Maggio.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GEMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 11/05/2018	NUOVE FOGLIE (rispetto al rilievo del 3 maggio)	FENOLOGIA GRAPPOLO
Colfosco	Glera	12	+3	Rigonfiamento infiorescenze
Crevada	Glera	11	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Formeniga	Glera	12	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Ogliano	Glera	12	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Villa di Villa	Glera	12	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Cordignano	Pinot Grigio	12	+4	Rigonfiamento infiorescenze
San Fior	Pinot Grigio	12	+3	Rigonfiamento infiorescenze
San Giacomo di V.	Pinot Grigio	11	+3	Rigonfiamento infiorescenze
San Vendemiano	Pinot Grigio	12	+3	Rigonfiamento infiorescenze
Colle Umberto	Chardonnay	11	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Conegliano	Chardonnay	11	+1	Rigonfiamento infiorescenze

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

PERONOSPORA:

Vista l'instabilità meteorologica prevista per le giornate di domenica, lunedì e forse martedì, si consiglia di intervenire prima delle piogge con un prodotto di copertura tra i seguenti:

Metiram o Propineb o Rame

Si consiglia di porre attenzione al numero di metiram fin qui effettuati, considerando che ne sono consentiti 3 come prima sostanza attiva.

Se le piogge previste si dovessero confermare importanti, verso la metà della prossima settimana sarà necessario ripetere il trattamento a base di Metalaxyl-m o Dimetomorf alternando il principio attivo rispetto a quello impiegato nel bollettino del 7 maggio.

Si ricorda a coloro che hanno utilizzato Fosetil allumino o fosfonati di proseguire con l'utilizzo per almeno 3 interventi consecutivi. Evitare miscele estemporanee di Fosetil alluminio o fosfonati con rame, che potrebbero causare problemi di fitotossicità.

OIDIO:

Abbinato al trattamento antiperonosporico sarà consigliato: **zolfo bagnabile**

Viticoltura biologica

Si consiglia il ripristino della copertura, entro la giornata di sabato 12, con:

Rame nella forma di Poltiglia Bordolese oppure Ossicloruro di rame alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro.

e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 4 kg/ha)

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI