



# Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

## 19° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 19 del 2 luglio 2018

### METEO

La fase a meteo stabile dei giorni scorsi tende a diminuire nel corso delle prossime ore. Si prevedono nel complesso significativi spazi di sereno, ma anche qualche fase nuvolosa con delle precipitazioni un po' più probabili da martedì per l'aumento dell'instabilità termoconvettiva.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it))

### FENOLOGIA

I rilievi effettuati martedì 26 giugno evidenziano un ulteriore crescita degli acini. Anche per lo Chardonnay ormai il grappolo si sta avvicinando alla chiusura, mentre per la Glera, malgrado l'accrescimento delle bacche, il grappolo resta spargolo.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 26/06/2018
Colfosco	Glera	La maggior parte delle bacche si toccano
Crevada	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Formeniga	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Ogliano	Glera	La maggior parte delle bacche si toccano
Villa di Villa	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Cordignano	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Fior	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Giacomo di V.	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Vendemiano	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
Colle Umberto	Chardonnay	La maggior parte delle bacche si toccano
Conegliano	Chardonnay	La maggior parte delle bacche si toccano

### STRATEGIA DI DIFESA

#### Viticoltura Integrata

Si consiglia di intervenire entro martedì 3 luglio, cercando di anticipare le possibili piogge previste verso sera.

#### PERONOSPORA

Vista la dimensione degli acini raggiunta la pressione di malattia sta diminuendo sensibilmente, pertanto si consiglia di ripristinare la protezione della vegetazione prima delle possibili piogge con prodotti rameici, e in particolare con:

**300 g/ha di rame metallo sotto forma di poltiglia bordolese**  
**300 g/ha di rame metallo sotto forma di idrossido**

Si raccomanda inoltre di mantenere un volume di bagnatura durante l'esecuzione dei trattamenti che sia non inferiore ai 500 litri per ettaro.

Per i soci che avessero riscontrato problemi con la malattia in questione si prega di contattare il gruppo tecnico per definire il proseguo specifico della difesa.

### **OIDIO:**

Si consiglia di ripristinare la protezione tramite l'impiego di **zolfo bagnabile** alla dose minima di **4 kg/ha**.

Anche relativamente all'oidio, i soci che avessero problemi in vigneto possono contattare il gruppo tecnico per definire adeguata strategia di difesa.

### **Viticoltura biologica**

Per coloro i quali non avessero effettuato il trattamento consigliato in data venerdì 29 giugno, si consiglia di ripristinare la copertura entro martedì 3 luglio secondo quanto di seguito indicato:

**Rame** nella forma di idrossido di rame alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro.  
e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 5 kg/ha)

### **INSETTI**

#### **TIGNOLE**

Anche con il rilievo eseguito in data di martedì 26 si registra un ridottissimo numero di catture (vedi tabella sottostante). Più nello specifico le catture di *Lobesia botrana* sono nulle in 6 delle 11 stazioni, nelle rimanenti il numero è esiguo. Anche per *Eupoecilia ambiguella* gli individui catturati sono molto scarsi.

Data la situazione descritta si ritiene che il rischio di danno da tignole sia molto contenuto, tale da non giustificare ad oggi l'intervento insetticida.

<b>Comune</b>	<b><i>Eupoecilia ambiguella</i></b>	<b><i>Lobesia botrana</i></b>
Colfosco	0	4
Crevada	8	1
Formeniga	2	2
Ogliano	0	0
Villa di Villa	0	2
Cordignano	1	0
San Fior	1	0
San Giacomo di V.	3	0
San Vendemiano	1	1
Colle Umberto	0	0
Conegliano	0	0

## **SCAPHOIDEUS TITANUS**

Nel corso della scorsa settimana sono state distribuite le trappole cromotropiche per il monitoraggio degli individui adulti, al fine di valutare l'efficacia degli interventi eseguiti contro la cicalina della flavescenza dorata. Nei prossimi giorni, le trappole verranno raccolte ed analizzate. Le informazioni ottenute saranno utilizzate per proseguire, se necessario, il controllo di tale fitofago.

**ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI**