



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

20° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 20 del 6 luglio 2018

METEO

Fino alla prima parte di sabato, correnti settentrionali debolmente cicloniche, renderanno il tempo variabile, a tratti anche instabile nel pomeriggio di venerdì. In seguito, pressione in graduale aumento con tempo più stabile e soleggiato.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.apra.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi effettuati martedì 04 luglio sui vigneti testimone non evidenziano ancora un inizio dell'invaiatura sulle varietà precoci, che è timidamente iniziata invece sui vigneti magri e meglio esposti.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 26/06/2018
Colfosco	Glera	La maggior parte delle bacche si toccano
Crevada	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Formeniga	Glera	La maggior parte delle bacche si toccano
Ogliano	Glera	La maggior parte delle bacche si toccano
Villa di Villa	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Cordignano	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Fior	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Giacomo di V.	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Vendemiano	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
Colle Umberto	Chardonnay	La maggior parte delle bacche si toccano
Conegliano	Chardonnay	La maggior parte delle bacche si toccano

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Ad oggi le previsioni meteo non evidenziano l'arrivo di perturbazioni per la prossima settimana; si consiglia comunque di intervenire entro martedì 10 luglio secondo quanto di seguito indicato.

PERONOSPORA

Considerata la fase fenologica molto avanzata, prossima all'invaiatura, si consiglia di ripristinare la protezione della vegetazione con i prodotti rameici di seguito specificati:

1. **ossicloruro di rame** oppure **poltiglia bordolese** alla dose di 300 g/ha di rame metallo
+
idrossido di rame alla dose di 300 g/ha di rame metallo
oppure
2. **rame da solfato tribasico** alla dose di 600 g/ha di rame metallo.

Si raccomanda inoltre di mantenere un volume di bagnatura durante l'esecuzione dei trattamenti che sia non inferiore ai 500 litri per ettaro.

Per i soci che avessero riscontrato problemi con la malattia in questione si prega di contattare il gruppo tecnico per definire il proseguo specifico della difesa.

OIDIO:

Si consiglia di ripristinare la protezione tramite l'impiego di **zolfo bagnabile** alla dose minima di **4 kg/ha**.

Anche relativamente all'oidio, i soci che avessero problemi in vigneto possono contattare il gruppo tecnico per definire adeguata strategia di difesa.

Viticoltura biologica

Il trattamento consigliato entro martedì 3 luglio ha garantito la protezione per le piogge della settimana in corso. Si consiglia di ripristinare la copertura entro martedì 10 e con le stesse sostanze suggerite per la "Viticoltura integrata" riducendone la dose totale di rame metallo da 600 g/ha a 400 g/ha a causa dei noti limiti di utilizzo.

INSETTI

TIGNOLE

Il rilievo eseguito in data di martedì 4 luglio evidenzia il protrarsi di una situazione con catture sporadiche e numericamente molto contenute. Data la situazione descritta si ritiene che il rischio di danno da tignole sia molto contenuto.

Comune	<i>Eupoecilia ambiguella</i>	<i>Lobesia botrana</i>
Colfosco	1	0
Crevada	9	0
Formeniga	0	0
Ogliano	0	0
Villa di Villa	0	0
Cordignano	0	0
San Fior	0	1
San Giacomo di V.	2	6
San Vendemiano	0	0
Colle Umberto	1	2
Conegliano	0	0

Cocciniglie *Planococcus ficus*

Anche se in pochissimi casi, il monitoraggio eseguito sul territorio ha messo in evidenza l'inizio della migrazione delle cocciniglie su foglie e grappoli. I soci che ne riscontrassero la presenza in vigneto, sono pregati di contattare uno dei tecnici della cantina per stabilire la più adeguata strategia di difesa.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI