



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

24° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 24 del 27 luglio 2018

METEO

Un nucleo depressionario in quota è in spostamento dall'Est Europa sull'alto Adriatico nelle giornate di ieri e oggi. Da sabato l'ingresso di una vasta area anticiclonica da Sud-Ovest determinerà tempo stabile con temperature in rialzo con valori che si porteranno sopra la media del periodo.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi fenologici evidenziano il completamento dell'invaiatura delle varietà precoci nella maggior parte dei vigneti. Per la Glera, nei vigneti più esposti e caldi l'invaiatura appare molto avanzata mentre nelle zone più fresche sta iniziando in questi giorni.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 27/07/2018
Colfosco	Glera	75% invaiatura
Crevada	Glera	Inizio invaiatura
Formeniga	Glera	100% invaiatura
Ogliano	Glera	75% invaiatura
Villa di Villa	Glera	25% invaiatura
Cordignano	Pinot grigio	100% invaiatura
San Fior	Pinot grigio	75% invaiatura
San Giacomo di V.	Pinot grigio	100% invaiatura
San Vendemiano	Pinot grigio	100% invaiatura
Colle Umberto	Chardonnay	100% invaiatura
Conegliano	Chardonnay	100% invaiatura

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento consigliato a inizio settimana e precisamente nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24 ha garantito la copertura per le piogge degli ultimi giorni; ma considerando lo stadio fenologico raggiunto dalla Glera, che non ci permette ancora di fermare l'attività di intervento in campo, si consiglia di ripetere la copertura nei primi giorni della prossima settimana.

PERONOSPORA

Considerata la fase stagionale in cui ci troviamo è opportuno proseguire con la difesa a base di prodotti rameici secondo quanto di seguito specificato:

1. ossicloruro di rame oppure **poltiglia bordolese** alla dose di 300 g/ha di rame metallo

+

idrossido di rame alla dose di 300 g/ha di rame metallo

oppure

2. idrossido di rame alla dose di 600 g/ha di rame metallo.

Escludere dal trattamento le varietà precoci (Pinot Grigio e Chardonnay). Per le altre che presentano un grado di invaiatura inferiore, è consigliabile trattare solo la parte alta della vegetazione, evitando di irrorare i grappoli.

Per i soci che avessero riscontrato problemi con la malattia in questione si prega di contattare il gruppo tecnico.

OIDIO:

Si consiglia di ripristinare la protezione tramite l'impiego di **zolfo bagnabile** alla dose minima di **3 kg/ha**.

Anche relativamente all'oidio, i soci che avessero problemi in vigneto possono contattare il gruppo tecnico.

Viticoltura biologica

Anche per la viticoltura biologica si consiglia il ripristino della copertura ad inizio settimana prossima con idrossido di rame alla dose di 400 g/ha di rame metallo. Si ricorda in questa sede il limite massimo di impiego di rame metallo annuo è fissato a 6 kg/ha. Nel caso di annate particolarmente piovose è possibile comunicare al proprio ente certificatore la necessità di sforare tale limite, tenendo presente però che la limitazione è comunque fissata ai 30 kg/ha totali nell'ultimo quinquennio.

CONCIMAZIONI FOGLIARI

Le concimazioni fogliari, particolarmente con Potassio e Magnesio, dovrebbero ormai in questa fase volgere al termine. Coloro che avessero già eseguito 3 interventi, possono terminare gli apporti.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI