



Bollettino del 11/05/2017

METEO

ARPAV-SERVIZIO METEOROLOGICO REGIONALE: nella prima parte della settimana in corso si sono verificate piogge modeste ma ripetute che hanno portato ad un accumulo di precipitazioni che hanno raggiunto 15 mm in alcune località. Per i prossimi giorni è prevista una ripresa delle temperature sulla nostra regione, nel contesto di un tempo variabile con qualche fase di moderata instabilità e precipitazioni.

FENOLOGIA

Le osservazioni in campo eseguite martedì 9 maggio sottolineano un progresso fenologico della vegetazione, che mediamente è stato di circa 2 foglie nell'ultima settimana. Ad oggi i germogli di Glera hanno circa 9-10 foglie, mentre Pinot grigio e Chardonnay mantengono mediamente una foglia in meno.

Difesa Integrata

Peronospora

La copertura consigliata per i giorni venerdì 5 e sabato 6 maggio, seppur fortificata dalla presenza di Fosetyl allumino o Fosfonati, a fronte delle piogge verificatesi negli ultimi giorni terminerà la sua efficacia tra sabato 13 e domenica 14 maggio. Nell'arco dell'ultima settimana è stata riscontrata una crescita vegetativa significativa a fronte dell'innalzamento delle temperature, pertanto i modelli previsionali riportano un termine di efficienza della copertura. Si consiglia pertanto quanto segue:

Fluopicolide o Dimetomorf o Mandipropamide più Fosetyl Al/Fosfonati più Metiram

Per coloro che non intendono usare Fosetyl Al/Fosfonati si suggerisce in alternativa:

Dimetomorf o Mandipropamide più Metiram

Il tutto a dose media per ha indicata in etichetta.

Controllare l'intervallo tra i trattamenti indicato in etichetta.

Oidio

I modelli previsionali indicano la possibilità di nuove infezioni in concomitanza con le piogge della prossima settimana; si consiglia pertanto di ripristinare la copertura nelle stesse date indicate per la peronospora con:

zolfo bagnabile alla dose di 4 kg/ha, più

Metrafenone o IBS (attenzione ai limiti Import Tolerance per USA), alla dose media per ha indicata in etichetta.

Biologici:

Si consiglia di ripristinare la copertura attraverso l'utilizzo di:

Poltiglia bordolese a dose minima di etichetta

e

zolfo bagnabile alla dose di 4 kg/ha.

Visto che la parte ha raggiunto uno spessore consistente si consiglia di non scendere al disotto dei 300 l/ha di volume di bagnatura.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI