



Bollettino Concimazione del 20 Marzo 2018

Qualità Verificata - Bollettino concimazione primaverile

Si ricorda ai soci partecipanti al progetto Qualità Verificata, che sul portale dedicato della cantina sono riportate le informazioni utili alla concimazione dei vigneti. Ciascun viticoltore potrà accedere ai suoi appezzamenti, dove troverà la linguetta "Concimazioni consigliate"; al suo interno è presente una tabella con le unità fertilizzanti per ciascun macroelemento: Azoto, Fosforo e Potassio (N.B. i quantitativi di fertilizzante potranno variare a seconda che sia stata eseguita o meno una letamazione nell'arco dell'annata precedente annata 2016/17).

Di seguito una tabella di esempio:

	Azoto	Fosforo	Potassio
vigneto inerbito	80	40	120
Letamazione annata precedente	60	30	90

I valori indicati in tabella per i diversi elementi sono da considerarsi totali distribuibili ad ettaro nell'annata agraria 2017/18. Gli apporti consigliati di elementi nutritivi tengono conto della denominazione di appartenenza del vigneto (DOCG o DOC) e delle relative produttività massime previste dal disciplinare. Per i soci che hanno già eseguito una concimazione autunnale: le unità distribuibili nel periodo primaverile/estivo 2018, saranno quelle ottenute sottraendo al totale indicato in tabella quelle già distribuite in autunno. Le letamazioni eseguite successivamente all'ultima vendemmia devono essere considerate nel conteggio delle concimazioni per l'annata 2017/18; nella tabella sottostante i valori di riferimento per apporti di 100 q.li/ha tal quale:

	AZOTO	FOSFORO	POTASSIO
letame bovino	50	10	60
liquame bovino	40	13	35

Ai soci che correttamente avessero già effettuato la concimazione autunnale, distribuendo anche una quota parte di Azoto, si consiglia di completare l'apporto nutritivo nel periodo immediatamente successivo alla fioritura della vite.

A coloro i quali in autunno avessero apportato principalmente Fosforo e Potassio si consiglia di intervenire con la concimazione azotata frazionando l'apporto in due momenti: quando i germogli raggiungono lo sviluppo di 10 cm circa e nel post fioritura.

Per chi non fosse intervenuto in autunno 2017 si consiglia di effettuare la concimazione sempre frazionando l'apporto in almeno due momenti, dopo il germogliamento e dopo la fioritura.

Si precisa che nel caso di vigneti giovani (1° e 2° anno) gli apporti di elementi nutritivi sono indicati nella tabella sottostante, sempre come quantità annue ad ettaro.

	Azoto	Fosforo	Potassio
vigneto 1° anno	40	15	20
vigneto 2° anno	60	25	40

Da un punto di vista pratico si ricorda che:

- è vantaggioso frazionare gli apporti di azoto per ridurre il "dilavamento", per apporti superiori ai 60 kg/ha con concimi minerali, il frazionamento è obbligatorio in almeno 2 interventi separati;
- Fosforo e Potassio possono essere apportati in un'unica soluzione;
- l'apporto del concime per i nuovi impianti (1° e 2° anno) deve essere obbligatoriamente fatto al piede.