



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

Pre-14° Bollettino: situazione fitosanitaria

Pre-Avviso n° 14 del 18 Maggio 2018

METEO

Sulla pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su rilievi e zone limitrofe tempo variabile e a tratti instabile più probabilmente nelle ore pomeridiane. Martedì condizioni di bassa pressione, attese varie piogge.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.apa.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi fenologici effettuati venerdì 18 Maggio evidenziano un ulteriore progresso della vegetazione e l'inizio della fioritura relativamente alle varietà più precoci in alcune stazioni. In tabella sono riportati i dati relativi al rilievo del 18 Maggio.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 18/05/2018	NUOVE FOGLIE (rispetto al rilievo del 11 maggio)	FENOLOGIA GRAPPOLO
Colfosco	Glera	15	+3	Rigonfiamento infiorescenze
Crevada	Glera	14	+3	Rigonfiamento infiorescenze
Formeniga	Glera	13	+1	Rigonfiamento infiorescenze
Ogliano	Glera	14	+2	Rigonfiamento infiorescenze
Villa di Villa	Glera	13	+1	Rigonfiamento infiorescenze
Cordignano	Pinot Grigio	13	+1	Rigonfiamento infiorescenze
San Fior	Pinot Grigio	14	+2	30% fioritura
San Giacomo di V.	Pinot Grigio	13	+2	Rigonfiamento infiorescenze
San Vendemiano	Pinot Grigio	15	+3	30% fioritura
Colle Umberto	Chardonnay	15	+4	10% fioritura
Conegliano	Chardonnay	14	+3	10% fioritura

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento consigliato in data di mercoledì 16 garantirà la protezione anche per le precipitazioni che si dovrebbero verificare nella giornata di martedì 22 e mercoledì 23. Nella giornata di lunedì 21, quando saranno più chiare le previsioni meteo, sarà emessa una nuova comunicazione per quanto concerne la prosecuzione della strategia.

Relativamente alla strategia di difesa nel prossimo bollettino saranno consigliate le seguenti sostanze attive:

PERONOSPORA

Oxathiapiprolin o in alternativa **CAA (Mandipropamide, Dimetomorf, etc.)**
avendo cura di non ripetere più volte lo stesso CAA.

Per coloro che avessero in atto linea di difesa con Fosfonati/Fosetyl Al potranno usare

Fluopicolide

Il tutto in abbinamento a:

Metiram o Propineb o Rame.

Il tutto alla dose di etichetta ad ettaro.

Si ricorda a coloro che hanno utilizzato Fosetyl Allumino o Fosfonati di proseguire con l'utilizzo per almeno 3 interventi consecutivi. Evitare miscele estemporanee di Fosetyl Alluminio o Fosfonati con rame, che potrebbero causare problemi di fitotossicità.

Si consiglia di porre attenzione al numero di Metiram fin qui effettuati, considerando che ne sono consentiti 3, quando questo è presente nel formulato come prima sostanza attiva.

OIDIO:

Metrafenone o in alternativa **IBS (Tetraconazolo, Difenoconazolo, etc.)**

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

Viticoltura biologica

Si consiglia il ripristino della copertura, entro la giornata di lunedì 21, con:

Rame nella forma di Poltiglia Bordolese oppure Ossicloruro di rame alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro.
e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 5 kg/ha)

Nell'arco della prossima settimana si dovrebbero riscontrare i primi segnali di fioritura su Glera, per tanto si raccomanda cautela nell'utilizzo di dosaggi abbondanti di prodotti rameici.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI