



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

Pre-15° Bollettino: situazione fitosanitaria

Pre-Avviso n° 15 del 25 Maggio 2018

METEO

Il Veneto si troverà nei prossimi giorni sul margine di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo, che garantirà tempo in prevalenza soleggiato; tuttavia, la marginale influenza di correnti cicloniche, che lambiranno i confini dell'anticiclone, potranno accentuare l'instabilità termoconvettiva sulle zone montane e localmente in pianura, dando luogo a rovesci o temporali soprattutto al pomeriggio.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi fenologici effettuati venerdì 25 Maggio evidenziano ulteriori progressi nella crescita dei germogli. Inoltre, la delicata fase della fioritura sta per volgere al termine sia per le varietà precoci Pinot grigio e Chardonnay, sia per la Glera nelle zone più esposte. In tabella sono riportati i dati relativi al rilievo del 25 Maggio.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO (foglie spiegate e separate dal germoglio) 25/05/2018	NUOVE FOGLIE (rispetto al rilievo del 18 maggio)	FENOLOGIA GRAPPOLO 25/05/2018
Colfosco	Glera	16	+1	80% fioritura
Crevada	Glera	16	+2	30% fioritura
Formeniga	Glera	15	+2	50% fioritura
Ogliano	Glera	16	+3	80% fioritura
Villa di Villa	Glera	15	+2	80% fioritura
Cordignano	Pinot Grigio	14	+1	100% fioritura
San Fior	Pinot Grigio	15	+1	Comparsa dei frutti
San Giacomo di V.	Pinot Grigio	14	+1	80% fioritura
San Vendemiano	Pinot Grigio	16	+1	100% fioritura
Colle Umberto	Chardonnay	16	+1	100% fioritura
Conegliano	Chardonnay	16	+2	90% fioritura

Si consiglia di terminare le operazioni di convogliamento della vegetazione in tempi rapidi per favorire l'efficacia degli interventi fitosanitari.

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento consigliato in data di mercoledì 23 garantirà la protezione fino alla metà-fine della prossima settimana. Nella giornata di martedì 29, quando saranno più chiare le previsioni meteo, sarà emessa una nuova comunicazione per quanto concerne la prosecuzione della strategia.

Relativamente alla strategia di difesa nel prossimo bollettino saranno molto probabilmente consigliate le seguenti sostanze attive:

PERONOSPORA

Oxathiapiprolin o in alternativa Zoxamide

avendo cura di non ripetere più volte lo stesso principio attivo.

Per coloro che avessero in atto linea di difesa con Fosfonati/Fosetyl Al si ricorda di non superare le 3 applicazioni per ridurre le possibilità di riscontrare residualità.

Il tutto in abbinamento a **Metiram o Propineb o Rame**

Il tutto alla dose di etichetta ad ettaro.

Si consiglia di porre attenzione al numero di Metiram fin qui effettuati, considerando che ne sono consentiti 3, quando questo è presente nel formulato come prima sostanza attiva. Si ricorda inoltre che il limite di applicazione dei ditiocarbammati è il termine della fioritura.

OIDIO:

Metrafenone o in alternativa IBS (Tetraconazolo, Difenoconazolo, etc.)

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

Viticoltura biologica

Si consiglia il ripristino della copertura, entro la sabato 26, con:

Rame nella forma di Poltiglia Bordolese oppure Ossicloruro di rame alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro.

e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 5 kg/ha)

Essendo in atto la delicata fase di fioritura su Glera si raccomanda cautela nell'utilizzo di dosaggi abbondanti di prodotti rameici.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI