



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

Pre-16° Bollettino: situazione fitosanitaria

Pre-Avviso n° 16 del 05 Giugno 2018

METEO

Il Veneto continua a trovarsi in una posizione intermedia tra una zona di bassa pressione situata sulla penisola iberica e un promontorio anticlonico presente sul Mediterraneo centro-orientale. Fino a mercoledì tempo variabile con maggiore soleggiamento al mattino e nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali con locali rovesci e temporali. Seguirà una nuova fase più instabile tra giovedì e venerdì.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

Su gran parte dei vigneti di monitoraggio è stata eseguita la prima cimatura, di conseguenza è stato interrotto il monitoraggio della fenologia germogli. Relativamente ai grappoli i rilievi effettuati venerdì 01 Giugno evidenziano come la fioritura si sia conclusa su tutte le varietà. In tabella sono riportati i dati relativi al rilievo del primo giugno a confronto con quelli del 25 Maggio.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO	
		01/06/2018	25/05/2018
Colfosco	Glera	Bacche più piccole di un grano di pepe	80% fioritura
Crevada	Glera	Bacche più piccole di un grano di pepe	30% fioritura
Formeniga	Glera	Bacche più piccole di un grano di pepe	50% fioritura
Ogliano	Glera	Bacche più piccole di un grano di pepe	80% fioritura
Villa di Villa	Glera	Bacche più piccole di un grano di pepe	80% fioritura
Cordignano	Pinot Grigio	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe	100% fioritura
San Fior	Pinot Grigio	Bacche delle dimensioni tra grano di pepe e grano di pisello	Comparsa dei frutti
San Giacomo di V.	Pinot Grigio	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe	80% fioritura
San Vendemiano	Pinot Grigio	Bacche delle dimensioni tra grano di pepe e grano di pisello	100% fioritura
Colle Umberto	Chardonnay	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe	100% fioritura
Conegliano	Chardonnay	Bacche delle dimensioni di un grano di pepe	90% fioritura

Si consiglia di terminare le operazioni di convogliamento della vegetazione in tempi rapidi per favorire l'efficacia degli interventi fitosanitari.

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento consigliato in data di Venerdì 01 Giugno garantirà la protezione fino alla fine della settimana in corso. Nella giornata di Venerdì 08, quando saranno più chiare le previsioni meteo, sarà emessa una nuova comunicazione per quanto concerne le possibili date utili per l'esecuzione del trattamento.

Relativamente alla strategia di difesa nel prossimo bollettino saranno molto probabilmente consigliate le seguenti sostanze attive:

PERONOSPORA

Ametoctradin con partner di copertura a base di **Rame**

o in alternativa:

Cyazofamide,

oppure anche **CAA (Mandipropamide, Dimetmorph, etc.)** per coloro che non potessero più fare ulteriori interventi con fosfonati/fosetyl-Al

Per coloro che avessero in atto linea di difesa con Fosfonati/Fosetyl Al si ricorda di non superare le 3 applicazioni per ridurre le possibilità di riscontrare residualità; si ricorda inoltre che il limite di applicazione dei ditiocarbammati è il termine della fioritura.

OIDIO:

Strobilurina (Trifloxystrobin, Azoxystrobin, etc.)

o in alternativa:

Quinoxifen o Cyflufenamid

in abbinamento a **zolfo bagnabile** alla dose di almeno 5 kg/ha.

BOTRITE:

I rilievi fenologici evidenziano come ci si stia avvicinando, per le varietà precoci (pinot grigio e chardonnay) alla fase di prechiusura grappolo. E' verosimile che nel prossimo bollettino e sulla base dei rilievi fenologici che verranno eseguiti tra giovedì 7 e venerdì 8 verrà consigliato il trattamento antibotritico con:

Cyprodinil – Fludoxonil

o

Fenexamid

INSETTI:

Il monitoraggio delle tignole non ha evidenziato alcun inizio di volo in nessuna delle 11 stazioni; relativamente allo Scaphoideus titanus, lo stadio di sviluppo dell'insetto non è tale da consigliare il trattamento.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI