



Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto

18° Bollettino: situazione fitosanitaria

Avviso n° 18 del 22 giugno 2018

METEO

L'alta pressione delle Azzorre è in fase di cedimento per l'arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fresca di origine nord atlantica. Questo impulso perturbato determinerà dei temporali e da venerdì un significativo calo termico. In seguito la pressione tenderà nuovamente ad aumentare con rasserenamenti alternati a qualche fase nuvolosa e temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali. L'aria tenderà a diventare più secca per l'arrivo di aria più fresca proveniente dal nord Europa.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale www.arpa.veneto.it)

FENOLOGIA

I rilievi effettuati Giovedì 21 giugno evidenziano una naturale progressione nella crescita dei grappoli. Nelle varietà precoci i grappoli sono chiusi, mentre nella Glera e Chardonnay gli acini iniziano a toccarsi.

LOCALITÀ	VARIETÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 21/06/2018
Colfosco	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Crevada	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Formeniga	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Ogliano	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Villa di Villa	Glera	Le bacche iniziano a toccarsi
Cordignano	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Fior	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Giacomo di V.	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
San Vendemiano	Pinot grigio	La maggior parte delle bacche si toccano
Colle Umberto	Chardonnay	Le bacche iniziano a toccarsi
Conegliano	Chardonnay	Le bacche iniziano a toccarsi

STRATEGIA DI DIFESA

Viticoltura Integrata

Il trattamento suggerito in data 18 giugno dovrebbe garantire adeguata protezione per le piogge del fine settimana. Sarà opportuno intervenire nella giornata di lunedì 25.

PERONOSPORA

Vista la dimensione degli acini raggiunta la pressione di malattia sta diminuendo sensibilmente, pertanto si consiglia di ripristinare la protezione della vegetazione con prodotti rameici e in particolare con:

300 g/ha di rame metallo sotto forma di ossicloruro
300 g/ha di rame metallo sotto forma di idrossido

Per i vigneti siti in zone più umide o laddove ci siano rischi di bagnature fogliari notturne particolarmente significative si suggerisce di abbinare alla miscela sopra indicata un **CAA(dimetomorph, mandipropamide, iprovalicarb, ecc.).**

Per chi avesse esaurito i CAA consentiti si suggerisce di utilizzare le seguenti alternative: **Cyazofamide** oppure **Zoxamide**

Si raccomanda inoltre di mantenere un volume di bagnatura durante l'esecuzione dei trattamenti che sia non inferiore ai 500 litri per ettaro.

Per i soci che avessero riscontrato problemi con la malattia in questione si prega di contattare il gruppo tecnico per definire il proseguo specifico della difesa.

OIDIO

Si consiglia di ripristinare la protezione tramite l'impiego di **zolfo bagnabile** alla dose minima di 4 kg/ha in abbinamento a **Quinoxifen** alla dose minima di etichetta.

Per i soci che avessero riscontrato problemi con la malattia in questione si prega di contattare il gruppo tecnico per definire il proseguo specifico della difesa.

Viticoltura biologica

L'intervento consigliato nel pre-bollettino garantirà buona protezione dalle piogge di questi giorni. Si consiglia il ripristino della copertura dopo gli eventi piovosi in caso di forti intensità (50 mm in un giorno) o comunque prima delle piogge che verosimilmente si verificheranno la prossima settimana, con:

Rame nella forma di idrossido di rame alla dose di 400 gr di rame metallo ad ettaro.
e **Zolfo Bagnabile** (alla dose minima 5 kg/ha)

INSETTI

TIGNOLE

Le catture delle tignole nelle trappole a feromone distribuite sul territorio afferente alla Cantina appaiono ancora molto scarse. Rispetto al precedente comunicato si sono ulteriormente ridotte le catture della tignola (*Eupoecilia ambiguella*). Il gruppo tecnico sta continuando il monitoraggio del territorio e, qualora si dovessero riscontrare aumenti di

catture, sarà emessa una nuova comunicazione. In tabella il dettaglio dei rilievi effettuati giovedì 21 giugno.

Comune	<i>Eupoecilia ambiguella</i>	<i>Lobesia botrana</i>
Colfosco	0	0
Crevada	8	0
Formeniga	0	0
Ogliano	0	0
Villa di Villa	0	0
Cordignano	0	0
San Fior	1	0
San Giacomo di V.	3	0
San Vendemiano	1	0
Colle Umberto	1	2
Conegliano	0	0

GESTIONE IN VERDE

Dato lo stadio fenologico raggiunto sia dalla vegetazione che dal grappolo è opportuno iniziare le operazioni di sfemminellatura/sfogliatura da localizzare sul lato est oppure nord in corrispondenza della fascia produttiva al fine di ridurre eventuali affastellamenti e consentire un'adeguata areazione.

ATTENZIONE: È IMPORTANTE LEGGERE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI